



โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

จำเป็นต้องรับประทานยากันชักทุกคนหรือไม่?

ผู้ป่วยโรคลมชักไม่จำเป็นต้องรับประทานยากันชักทุกคน เช่น ในผู้ป่วยที่มีการชักเพียงครั้งเดียว การชักรุนแรง (น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี) หรือ ในกรณีที่มีการชักชนิดไม่รุนแรงและการชักเป็นเฉพาะช่วงที่นอนหลับเท่านั้น ผู้ป่วยเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องรับประทานยากันชักเพราะมีโอกาสการชักซ้ำน้อยมาก และผลเสียจากการชักรุนแรงเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่มีการชักตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และเป็นการชักทั้งตัว หมดสติ มักจำเป็นต้องรับประทานยากันชัก แต่อย่างไรก็ตามความจำเป็น ต้องรับประทานยากันชักหรือไม่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของการเริ่มรับประทานยากันชักหรือไม่รับประทานในผู้ป่วยเป็นรายๆไป

โรคลมชักต้องรับประทานยาชนิดใด?

ผู้ป่วยโรคลมชักจะได้รับการรักษาด้วยยากันชักอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งแพทย์อาจจะนัดผู้ป่วยมาตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอทุก 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับผลการรักษาว่าควบคุมอาการชักได้หรือไม่ มีอาการชักบ่อยเพียงใดและประเมินว่า มีผลแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงจากยาหรือไม่รวมทั้งความสม่ำเสมอในการรับประทานยากันชัก

ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรต้องพบแพทย์ตรงตามนัดสม่ำเสมอตลอดไป หากทานยาอย่างต่อเนื่องและควบคุมอาการชักได้ แพทย์จะค่อยๆลดขนาดยาลงครั้งละ 15-20% ทุกๆ 1 - 2 เดือนอย่างช้าๆเป็นเวลารวมประมาณ 6 - 12 เดือน จนกระทั่งหยุดยากันชักได้ (ซึ่งรวมแล้วผู้ป่วยต้องรับประทานยากันชักรวมประมาณ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มรับประทานยากันชัก) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการชักบ่อยรุนแรงมากขึ้นหรือได้รับอุบัติเหตุจากการชักหรือมีผลแทรกซ้อนจากยาที่ผิดไปจากเดิม หรือมีผลข้างเคียงจากยาที่รุนแรง หรือมีอาการผิดปกติต่างๆที่ต่างไปจากเดิม หรือมีความกังวลในอาการ แนะนำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ก่อนนัด

