

เอกสารแนบ ซีแจ้งแก้ไข แนวทางเวชปฏิบัติ โรคลมชัก สำหรับแพทย์ ปี พ.ศ. 2559

หน้าที่ 55 ตารางที่ 18 ยากันชัก ที่ใช้ในการรักษาภาวะอาการชักต่อเนื่องในระยะ established (10-20 นาทีต่อมา) แก้ไขขนาดยา Maintenance ของ phenobarbital ในผู้ใหญ่ จาก 180-240 mg/kg/day เป็น 180-240 mg/day

ชนิดยา	ชนิดผู้ป่วย	ขนาดยา loading และอัตราเร็วของการให้	ขนาดยาสูงสุดในแต่ละครั้ง	ขนาดยา maintenance	ขนาดบรรจุ และวิธีการผสมยา	หมายเหตุ
phenytoin	เด็ก	20 mg/kg IV อัตราเร็ว < 1 mg/kg/min ให้ซ้ำได้อีก 10 mg/kg ถ้ายังไม่หยุดชักหลังเริ่มยา 30 นาที	1,500 mg	5-8 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 8 ชม.	250 mg/5 mL/vial ผสมใน 0.9%NSS เท่านั้น หลังผสมควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.ไม่ควรใช้ infusion pump เพราะจะเกิดตะกอน	- ระวังความดันเลือดต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะ metabolic acidosis - ถ้าให้เร็วอาจทำให้หลอดเลือดอักเสบ
	ผู้ใหญ่	20-30 mg/kg IV อัตราเร็ว < 50 mg/min		300-500 mg/day แบ่งให้ทุก 8 ชม.		
phenobarbital	เด็ก	20 mg/kg IV อัตราเร็ว < 2 mg/kg/min ให้ซ้ำได้อีก 10 mg/kg ถ้ายังไม่หยุดชักหลังเริ่มยา 30 นาที	1,000 mg	4-6 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 12 ชม.	200 mg/1 mL/vial ผสมใน sterile water 10 mL ก่อนนำมาผสมกับ 0.9%NSS หรือ Ringer lactate หรือ 5%D/W	- ระวังการกดการหายใจและระดับความรู้สึกตัว
	ผู้ใหญ่	20-30 mg/kg IV อัตราเร็ว 50-75 mg/min		180-240 mg/day แบ่งให้ทุก 12 ชม		
sodium valproate	เด็ก	20-40 mg/kg IV อัตราเร็ว < 1-3 mg/kg/min	NA	1-5 mg/kg/h	400 mg/4 mL/vial ผสมใน 0.9%NSS หรือ 5-10%D/W หลังผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 24 ชม.	- ระวังภาวะ hepatotoxic, pancreatitis, thrombocytopenia, hyperammonemia, - ไม่ควรใช้ในเด็กอายุ < 2 ปี
	ผู้ใหญ่	20-30 mg/kg IV อัตราเร็ว < 100 mg/min		1-2 mg/kg/h		